

FICHA TÉCNICA

ABAMEFIX

Abamectina
Concentrado emulsionable

COMPOSICIÓN

Abamectina (Avermectina): Avermectin B1: 1.80%

REGISTRO COFEPRIS:

RSCO-INAC-0174-342-009-002

FUNCIÓN

ABAMEFIX es un insecticida agrícola formulado como concentrado emulsionable. Recomendado para plagas y cultivos específicos.

USO EN CULTIVOS

Úsese exclusivamente en los cultivos y enfermedades aquí recomendados.

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS	OBSERVACIONES
Naranja, Toronjo, Limonero, Lima, Mandarino (7)	Aradoro Negrilla de los Cítricos (<i>Phyllocoptruta oleivora</i>) Araña Roja (<i>Panonychus citri</i>)	0.5-1.5 L/ha o mínimo 100-150 mL/100 L de agua	Agregar 250 mL de aceite mineral agrícola por 100 L. volumen de aplicación 1000 L de agua/ha.
Melón, Sandía, Pepino, Calabacita (3)	Minador de la Hoja (<i>Liriomyza spp</i>)	200-300 mL/100 L de agua	Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días durante la etapa de desarrollo vegetativo. Volumen de aplicación 700 L de agua/ha.
Fresa (3)	Acaro de dos Manchas (<i>Tetranychus urticae</i>)	0.5-1.5 L/ha	Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días durante la etapa de desarrollo vegetativo. Volumen de aplicación 700 L de agua/ha.
Chile, Jitomate, Tomate de cáscara, Papa (3)	Minador de la Hoja (<i>Liriomyza spp</i>) Araña Roja (<i>Tetranychus urticae</i>)	0.5-1.25 l/ha	Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días durante la etapa de desarrollo vegetativo. Volumen de aplicación 700 L de agua/ha.

(): Intervalo de seguridad en días que deberán transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

TIEMPO DE REENTRADA: 12 horas después de la aplicación.



MÉTODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Antes de usar el producto, agite el envase. Abra cuidadosamente el envase rompiendo el sello de garantía y antes de verter el producto al equipo de aplicación, realice una premezcla, en un recipiente limpio por separado, agregue agua hasta un tercio de su capacidad. Incorpore lentamente la cantidad de **ABAMEFIX** a utilizar, agitando continuamente hasta obtener una mezcla uniforme. Sin dejar de agitar, vierta la premezcla en el tanque de mezclado. Agregue agua (libre de sedimentos) hasta la totalidad de la capacidad del tanque, sin dejar de agitar, a fin de homogeneizar la mezcla. Aplicar de inmediato.

INCOMPATIBILIDAD QUÍMICA

ABAMEFIX es compatible con otros plaguicidas y deberán mezclarse solo con productos que tengan registros vigentes otorgados por la autoridad competente y estén autorizados en los cultivos aquí indicados. Es recomendable realizar una prueba preliminar con el fin de observar las reacciones que podría tener la mezcla y en el cultivo durante los tres días siguientes a la aplicación.

FITOTOXICIDAD

ABAMEFIX no es fitotóxico en los cultivos aquí indicados, si se aplica de acuerdo con las especificaciones de esta etiqueta.

MANEJO DE RESISTENCIA

Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de aplicación. Evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes métodos de acción y diferentes mecanismos de detoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control.

