

AGROMET 600

Metamidofos
Concentrado emulsionable

COMPOSICIÓN

Metamidofos no menos de 48.3%

REGISTRO COFEPRIS:

RSCO-INAC-0144-311-009-048

FUNCIÓN

AGROMET 600 es un insecticida de aplicación directa a la planta o foliar, recomendada para el combate y control de insectos plagas en los cultivos que aquí se indican. Está formulado como concentrado emulsionable y actúa por contacto e ingestión.

ESPECIFICACIONES

PROPIEDAD	Estándar
APARIENCIA	Líquido homogéneo
COLOR	Transparente
OLOR	Característico
Densidad (g/ml)	1.22 +/- 0.01

USO EN CULTIVOS

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (L/ha)	INTERVALO DE SEGURIDAD (DÍAS)*
Algodonero	Araña Roja (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	1.0-2.0	5
	Gusano Falso Medidor (<i>Trichoplusia ni</i>)	1.0-1.5	
	Chinche Lygus (<i>Lygus lineolaris</i>)	1.0	
	Pulgón del Algodón (<i>Aphis gossypii</i>)	0.75-1.0	
	Chinche Rápida (<i>Creontiades rubrinervis</i>)		
	Pulga Saltona (<i>Psallus seriatus</i>)		
	Pulga Saltona Negra (<i>Spanagonicus albofasciatus</i>)		
	Chinche Machacadora (<i>Dysdercus spp</i>)		
	Conchuela (<i>Chlorochroa ligata</i>)		
	Conchuela Verde (<i>Nezara viridula</i>)		
	Gusano Peludo (<i>Stigmene acraea</i>)		
	Gusano Soldado (<i>Spodoptera exigua</i>)		



	Mosquita Blanca (<i>Bermisia tabaco</i>) Trips (<i>Frankliniella spp</i>) Gusano Medidor De Algodón (<i>Alabama argillacea</i>)		
Col	Chinche Arlequin (<i>Murgantia histriónica</i>)	1.0	35
Col de Bruselas Coliflor Brócoli	Gusano del Corazón de la Col (<i>Copitarsia consueta</i>) Gusano Falso Medidor (<i>Trichoplusia ni</i>) Pulga Saltona (<i>Phyllotetra spp</i>) Palomilla Dorso De Diamante (<i>Plutella xylostella</i>) Gusano Soldado (<i>Spodoptera exigua</i>) Pulgón de la Col (<i>Brevycorine brassicae</i>) Mariposita Blanca (<i>Pieris rapae</i>)	1.0 1.0-1.5 1.0-1.5	35
Berenjena	Araña Roja (<i>Tetranychidae</i>) Gusano del Fruto (<i>Heliothis zea</i>) Gusano Falso Medidor (<i>Trichoplusia ni</i>) Gusano Soldado (<i>Spodoptera exigua</i>) Pulgón Myzus (<i>Myzus persicae</i>)	1.0 1.0-1.5 1.0	14
Chile	Araña Roja (<i>Tetranychus spp</i>) Gusano del Fruto (<i>Heliothis zea</i>) Gusano Falso Medidor (<i>Trichoplusia ni</i>) Gusano Soldado (<i>Spodoptera exigua</i>) Chicharritas (<i>Eutettix tenellus</i>) Diabrotica (<i>Diabrotica spp</i>) Minador de la Hoja (<i>Liriomyza spp</i>) Mosquita Blanca (<i>Trialeurodes spp</i>) Pulgón Myzus (<i>Myzus persicae</i>)	1.0-1.5 1.0 1.0-1.5 1.0	14
Jitomate	Araña Roja (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>) Gusano del Fruto (<i>Heliothis zea</i>) Minador de la Hoja (<i>Liriomyza vaporariorum</i>) Mosquita Blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>) Pulga Saltona (<i>Epitrix spp</i>) Pulgón Myzus (<i>Myzus persicae</i>) Chicharritas (<i>Eutettix spp</i>) Chinche Pequeña Del Tomate (<i>Dicyphus minimus</i>)	1.0-1.5 1.0 1.0-1.5 0.75-10 1.0-1.5 1.0	0



	Chinche Brincadora <i>(Diabrotica variegata)</i> Diabrotica <i>(Manduca sexta)</i> Gusano del Cuerno <i>(Trichoplusia ni)</i> Gusano Falso Medidor <i>(Spodoptera exigua)</i> Trips <i>(Frankliniella spp)</i> Pulgones <i>(Aphididae)</i>		
Lechuga	Gusano Falso Medidor <i>(Trichoplusia ni)</i> Gusano Soldado <i>(Spodoptera exigua)</i> Pulgón Myzus <i>(Myzus persicae)</i>	1.0	14
Papa	Catarinita de la Papa <i>(L. decemlineata)</i> Pulga Saltona <i>(Epitrix cucumeris)</i> Pulgón <i>(Macrosiphum solafinoli)</i> Pulgón Myzus <i>(Myzus persicae)</i> Chicharritas <i>(Empoasca spp)</i> Gusano Falso Medidor <i>(Trichoplusia ni)</i> Gusano Soldado <i>(Spodoptera exigua)</i> Mosquita Blanca <i>(Trialeurodes vaporarium)</i> Palomilla de la Papa <i>(Phtorimaea operculella)</i>	1.0-1.5 1.5 1.0-1.5	14
Melón	Araña Roja <i>(Oligonychus mexicanus)</i>	1.0-1.5	1
Pepino Sandía	Barrenador del Fruto <i>(Diaphania spp)</i> Chicharritas <i>(Empoasca spp)</i> Diabrotica <i>(Diabrotica spp)</i> Gusano Del Fruto <i>(Heliothis zea)</i> Gusano Falso Medidor <i>(Trichoplusia ni)</i> Gusano Peludo <i>(Estigmene acraea)</i> Gusano Soldado <i>(Spodoptera exigua)</i> Minador De La Hoja <i>(Liriomyza spp)</i> Mosquita Blanca <i>(Bermisia tabaci)</i> Pulga Saltona <i>(Epitrix spp)</i> Pulgón Del Melón <i>(Aphis gossypii)</i>	1.0-1.5 1.0-1.5	1
Ornamentales	Mosquita Blanca <i>(Aleyrodidae)</i> Gusano De La Hoja <i>(Varias especies de Lepidoptera)</i>	125 mL/100 L	1



MÉTODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

AGROMET 600 está formulado en forma e concentrado emulsionable, para aplicarse debe disolverse la dosis recomendada de productos en la cantidad de agua necesaria para lograr un cubrimiento total y uniforme del follaje de las plantas tratadas. Para cultivos bajos y equipo de aplicación terrestre, emplear de 200 a 400 L de agua por hectárea aproximadamente, y si la aplicación es con equipo aéreo emplear de 60 a 80 L de agua por hectárea.

INCOMPATIBILIDAD QUÍMICA

No mezclar con agentes oxidantes, materiales alcalinos, acero al carbón y aleaciones de cobre. Es inestable en pH alcalino.

MANEJO DE RESISTENCIA

Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de aplicación; evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes mecanismos de detoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control.

