

DIMETOATO 40% C.E.

Dimetoato
Concentrado emulsionable

COMPOSICIÓN

Dimetoato no menos de 37.40%

REGISTRO COFEPRIS:

RACO-INAC-0124-062-009-037

FUNCIÓN

Es un Insecticida con acción de contacto e ingestión, muy eficaz en el control de insectos masticadores, minadores y chupadores en frutales, vid, cítricos, hortalizas y cereales.

ESPECIFICACIONES

PROPIEDAD	Estándar
APARIENCIA	Líquido homogéneo sin partículas extrañas
COLOR	Ámbar
Densidad (g/ml)	1.03+/-0.04

USO EN CULTIVOS

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS (L/HA)	INTERVALO DE SEGURIDAD (DÍAS)
Limón Naranja Toronja	Arador o Negrilla (<i>Phyllocoptruta oleivora</i>) Escama Roja de Florida (<i>Chrysomphalus aonidum</i>) Escama Roja de California (<i>Aonidiella aurantii</i>) Escama Amarilla (<i>Aonidiella citrina</i>) Escama Púrpura (<i>Lepidosaphes beckii</i>) Mosquita Blanca (<i>Traleurodes vaporariorum</i>) Piojo Harinoso (<i>Dysmicoccus brevipes</i>) Pulgón negro (<i>Taxoptera aurantii</i>) Trips de los Citricos (<i>Scirtothrips citri</i>)	125-200 mL/100 L de agua	15
Manzano	Pulgón Lanígero (<i>Eriosoma lanigerum</i>) Escama de San José (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>)	125 m/100 L de agua	28
Algodonero	Chinche Lygus (<i>Lygus lineolaris</i>)	1.0-1.5	14



	Chinche Rápida (<i>Creontiades rubrinervis</i>) Pulga Saltona Negra (<i>Spanagonicus albofasciatus</i>) Chinche Machacadora (<i>Dysdercus spp</i>) Conchuela (<i>Chlorochroa ligata</i>) Conchuela Verde (<i>Nezara viridula</i>) Conchuela Café (<i>Euschistus servus</i>) Pulgón del Algodón (<i>Aphis gossypii</i>) Mosquita Blanca (<i>Bermicia tabaci</i>) Trips (<i>Frankliniella spp</i>)		
Frijol Ejotero	Mosquita Blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>) Minador de La Hoja (<i>Liriomyza munda</i>) Trips (<i>caliothrips paseoli</i>)	0.75 - 1.0	0
Maíz	Araña Roja (<i>Paratetranychus stickneyi</i>) Pulgón del Cogollo (<i>Rhopalosiphum maidis</i>) Chicharritas (<i>Eutettix tenellus</i>) Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	1.0	14
Trigo	Pulgón del Cogollo y del Follaje (<i>Rhopalosiphum maidis</i>) Pulgón de la Espiga (<i>Schizaophis graminum</i>)	1.0	60
Apio	Pulgones (<i>Aphididae</i>) Chinche Lygus (<i>Lygus Spp</i>)	0.5-1	28
Brócoli Col Coliflor	Pulgón de la Col (<i>Brevicorine brassicae</i>) Chinche Arlequin (<i>Murgantia histrionica</i>)	0.5-1	7
Chícharo	Pulgón Verde (<i>Acrythosiphon pisum</i>) Trips (<i>Frankliniella spp</i>) Minador de La Hoja (<i>Liriomyza munda</i>)	0.75 – 1.0 1.0	21
Chile	Pulga Saltona (<i>Epitrix spp</i>) Mosquita Blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>) Chinche Pequeña Del Tomate (<i>Dicyphus minimus</i>) Pulga negra (<i>Halticus spp</i>) Pulgones (<i>Aphididae</i>) Chicharritas (<i>Eutettix tenellus</i>) Trips (<i>Caliothrips phaseoli</i>)	1.0	21
Lechuga	Pulgones (<i>Myzus persicae Sulzer</i>)	1.0	21
Melón	Mosquita Blanca (<i>Bermisia tabaci</i>) Pulgón Del Melón (<i>Aphis gossypii</i>) Araña Roja (<i>Aphis gossypii</i>)	1.0	3



Papa	Pulgón (<i>Macrosiphum solafinolinii</i>) Chicharritas (<i>Empoasca spp</i>)	1.5	21
Sandia	Minador De La Hoja (<i>Liriomyza spp</i>) Pulgón Del Melón (<i>Aphis gossypii</i>) Mosquita Blanca (<i>Bermisia tabaci</i>) Araña Roja (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	1.0	
Soya	Trips Negro (<i>Caliothrips phaseoli</i>) Conchuela o Chinche Verde (<i>Nezara viridula</i>) Conchuela Café (<i>Euschistus servus</i>) Chinche Lygus (<i>Lygus spp</i>) Chicharritas (<i>Cicadellidae</i>)	1.0	21
Cártamo	Chinche Lygus (<i>Lygus spp</i>) Chinche Rápida (<i>Creontiades spp</i>)	1.0	14
Nogal	Pulgón Amarillo (<i>Monellia costalis</i>) Pulgón Negro (<i>Melanocallis caryae foliage</i>) Chinche Machacadora (<i>Dysdercus spp</i>)	1.0	21
Peral	Pulgón Lanigero (<i>Eriosoma lanigerum</i>) Escama de San José (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>) Pulgón Verde del Manzano (<i>Aphis pomi</i>)	125 mL/ 100 L de agua	28 0
Ornamentales	Pulgones (<i>Macrosiphum rosae</i>) Trips (<i>Thrips tabaci</i>)		
Alfalfa	Pulgón Manchado (<i>Therioaphis maculata</i>) Pulgón Verde (<i>Acyrthosiphon pisum</i>)	En Alfalfa fresca diluir en no menos de 300 L agua/ha	10
Jitomate	Minador de la Hoja (<i>Liriomyza spp</i>) Chicharritas (<i>Eutettix tenellus</i>) Chinche Pequeña Del Tomate (<i>Dicyphus minimus</i>) Pulga Negra (<i>Halticus spp</i>) Trips (<i>Caliothrips phaseoli</i>)	1.0 – 1.5	10

MÉTODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN Y APLICACIÓN

DIMETOATO 40% C.E. es insecticida concentrado emulsionable listo para ser diluido en las concentraciones indicadas en la tabla de cultivos, que al mezclarse con agua forma una emulsión estable. Para aplicación terrestre: de mochila o tractos diluir en 200 L de agua por hectárea. Para frutales: diluir las dosis recomendadas en 400 a 600 L de agua bañando bien el follaje sin que escurra.

INCOMPATIBILIDAD QUÍMICA

No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina. Cuando se desconozca la compatibilidad de alguna mezcla de uso agrícola, deberá hacerse una prueba previa a su aplicación para evitar efectos fitotóxicos.



FITOTOXICIDAD

Este producto no es fitotóxico en ninguno de los cultivos en que se encuentra autorizado su uso.

MANEJO DE RESISTENCIA

Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de aplicación; evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes mecanismos de detoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control.

