

FICHA TÉCNICA

BIFENCOR 100

Bifentrina
Concentrado emulsionable

COMPOSICIÓN

Bifentrina 10.75%

REGISTRO COFEPRIS

RSCO-INAC-0176-X0021-009-10.75

FUNCIÓN

BIFENCOR 100 es un insecticida piretroide, formulado como concentrado emulsionable. Se recomienda su uso para el control de mosquita blanca y pulgón cenizo en cultivos.

ESPECIFICACIONES

PROPIEDAD	ESTÁNDAR
Apariencia	Líquido color amarillo claro
Densidad (g/mL)	0.899-0.919
Solubilidad	Emulsionable en agua

USO EN CULTIVOS

Úsese exclusivamente en los cultivos y enfermedades aquí recomendados.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
Berenjena (7) Chile (7) Jitomate (3) Papa (1) Tomate de cáscara (1)	Mosquita blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	0.5-0.75 L/ha	Se recomienda realizar dos aplicaciones al follaje, a intervalos de 5 días; volumen de aplicación 450-550 L de agua/ha.
Brócoli (7) Col (7) Col de Bruselas (7) Coliflor (7)	Pulgón cenizo (<i>Brevucoryne brassicae</i>)	0.2-0.6 L/ha	Se recomienda realizar una aplicación al follaje; volumen de aplicación de 230-330 L de agua/ha.

() Intervalo de Seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: 24 horas después de haber aplicado el producto.

MÉTODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Durante el manejo, preparación de la mezcla y la aplicación de **BIFENCOR 100** siempre utilice equipo de protección personal. Para abrir el producto gire la tapa en sentido contrario a las manecillas del reloj. El agua a utilizar para la aplicación debe estar libre de sedimentos y tener un pH entre 5.5-7.0, si es necesario ajustar, adicionar una solución amortiguadora. Colocar agua hasta la mitad de la capacidad del tanque de mezclado y en un recipiente aparte preparar la pre mezcla en un lugar ventilado, lejos de fuentes de agua y solo la cantidad de mezcla a utilizar. Para medir la cantidad exacta del producto, utilice un equipo graduado. Agregar la dosis recomendada BIFENCOR 100, agitar y vaciar la solución de la pre-mezcla en el tanque de mezclado. Agregue agua hasta la totalidad de la capacidad del tanque, sin dejar de agitar a fin de homogeneizar la solución de la mezcla. Evite el contacto con la mezcla tanto al momento de la preparación como de la aplicación. Para aplicaciones terrestres puede utilizarse distintos equipos dependiendo de las condiciones físicas de la parcela y estado de desarrollo del cultivo. Se recomienda utilizar un aspersor motorizado acondicionado con una boquilla de cono, previamente calibrada.

INCOMPATIBILIDAD QUÍMICA

No mezclar **BIFENCOR 100** con otros productos.

FITOTOXICIDAD

BIFENCOR 100 no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados. No aplique en horas de calor intenso, ni cuando la velocidad del viento sea alta.

MANEJO DE RESISTENCIA

Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de aplicación. Evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes métodos de acción y diferentes mecanismos de detoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control.