

FICHA TÉCNICA



Clorpirifos etil + Permetrina
Concentrado emulsionable

COMPOSICIÓN

Clorpirifos etil: 39.1%

Permetrina: 4.71%

REGISTRO COFEPRIS

RSCO-MEZC-INAC-1105-0553-009-43.81

FUNCIÓN

TACKLEADOR es una mezcla de insecticidas formulado como Concentrado emulsionable, diseñado para el control de Trips y Gusano cogollero en cultivos.

ESPECIFICACIONES

PROPIEDAD	ESTÁNDAR
Apariencia	Líquido traslúcido color ámbar
Densidad	1.021-1.085
Solubilidad	Emulsionable en agua

USO EN CULTIVOS

Úsese exclusivamente en los cultivos y enfermedades aquí recomendados.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
Ajo (14) Cebolla (14)	Trips Thrips tabaci	2 L/ha	Se recomienda realizar una aplicación al follaje; con un volumen de aplicación de 450-550 L de agua / ha.
Maíz (21) Sorgo (21) Avena (21) Cebada (21)	Gusano cogollero Spodoptera frugiperda	1.0 – 1.25 L/ha	Se recomienda realizar una aplicación al follaje; con un volumen de aplicación de 350-450 L de agua/ ha.

() Intervalo de Seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: 12 horas después de haber aplicado el producto.

MÉTODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Durante el manejo, preparación de la mezcla y la aplicación de TACKLEADOR siempre utilice equipo de protección personal. Para abrir el producto gire la tapa en sentido contrario a las manecillas del reloj. El agua a utilizar para la aplicación debe estar libre de sedimentos y tener un pH entre 5.5-7.0, si es necesario ajustar, adicionar una solución amortiguadora. Colocar agua hasta la mitad de la capacidad del tanque de mezclado y en un recipiente aparte preparar la pre mezcla en un lugar ventilado, lejos de fuentes de agua y solo la cantidad de mezcla a utilizar. Para medir la cantidad exacta del producto, utilice un equipo graduado. Agregar la dosis recomendada **TACKLEADOR**, agitar y vaciar la solución de la pre-mezcla en el tanque de mezclado. Agregue agua hasta la totalidad de la capacidad del tanque, sin dejar de agitar a fin de homogeneizar la solución de la mezcla. Evite el contacto con la mezcla tanto al momento de la preparación como de la aplicación. Para aplicaciones terrestres puede utilizarse distintos equipos dependiendo de las condiciones físicas de la parcela y estado de desarrollo del cultivo. Se recomienda utilizar un aspersor motorizado acondicionado con una boquilla de cono, previamente calibrada, para asegurar una buena cobertura del follaje de las plantas.

INCOMPATIBILIDAD QUÍMICA

No mezclar **TACKLEADOR** con otros productos. sin embargo, si se desea mezclar, se recomienda que la mezcla se realice con productos registrados ante la autoridad competente para el cultivo recomendado en la etiqueta, haciendo pruebas preliminares de compatibilidad física y fitotoxicidad previas a la aplicación.

MANEJO DE RESISTENCIA

Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de aplicación. Evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes métodos de acción y diferentes mecanismos de detoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control.