

# TERRADUCOR 5%

Oxitetraciclina  
Polvo humectable

**COMPOSICIÓN**

Oxitetraciclina No menos de 7.33%.

**REGISTRO COFEPRIS:**

RSCO-FUNG-0330-004-003-007

**FUNCIÓN**

Este producto es una formulación que contiene oxitetraciclina, antibiótico no estéril, útil para controlar y prevenir enfermedades causadas por bacterias. Actúa en forma sistémica protegiendo a la planta interna y externamente. Se recomienda aplicar de forma preventiva, al observar los primeros indicios de infección y si las condiciones ambientales son favorables a los patógenos.

**ESPECIFICACIONES**

PROPIEDAD	Estándar
APARIENCIA	Polvo color ligeramente amarillo
HUMECTABILIDAD	60 s máximo
pH (solución 1%)	4.0-6.0

**USO EN CULTIVOS**

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS / Ha	APLICACIÓN
Peral (SL)	Tizón de fuego ( <i>Erwinia amylovara</i> )	200 g/100 L de agua	Aplicar durante el desarrollo del cultivo, en floración y durante el llenado de frutos.

**Tiempo de reentrada a la zona tratada:** 12 horas.

**(I) Intervalo de seguridad:** días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

**SL:** Sin Límite

**MÉTODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN**

Acondicione el agua a un pH de 5.5 a 6.5 para una mejor acción del producto. Se debe preparar la mezcla agregando la dosis recomendada en una cubeta con un poco de agua y se agita hasta producir una mezcla uniforme. Vierta esta mezcla en el tanque de aplicación que contenga la suficiente cantidad de agua para asegurar un cubrimiento uniforme de las superficies tratadas, procurando asperjar hasta el punto de goteo. Agite la mezcla cada vez que recargue el aspersor para asegurar una mezcla homogénea. El volumen de agua



que se aplique dependerá del cultivo y del equipo aspersor que se utilice. Para obtener una mayor calidad en la aplicación (cobertura, dispersión, extensión y humectación) es recomendable el uso de un coadyuvante. Para facilitar la penetración de su ingrediente activo y eficientar su efectividad biológica, se puede agregar 1 L de glicerina por cada 100 L de agua.

#### **INCOMPATIBILIDAD QUÍMICA**

Puede aplicarse mezclado con otros insecticidas y fungicidas excepto con caldo bordelés y productos con reacción alcalina. Cuando se desconozca la compatibilidad con otro producto realice con otro producto realice una prueba física previa para evitar efectos no deseados. Para las mezclas que se realicen con otros productos se recomienda utilizar los que cuenten con registro autorizado y vigente.

#### **CONTRAINDICACIONES**

Aplicarlo en peral después de la cosecha y antes de la formación de botones florales. No aplique en condiciones de lluvia para evitar que el producto sea lavado de las superficies tratadas. No se aplique en horas de calor intenso ni cuando el viento sea mayor a 15 km/h. No es fitotóxico a la dosis aquí recomendada. Algunas variedades pueden ser susceptibles.

#### **MANEJO DE RESISTENCIA**

Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de aplicación; evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes mecanismos de detoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control.

